

GDP+R 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
悪性リンパ腫	進行再発	21 日	高度

抗がん剤	投与量	投与日
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day 1, 8
シスプラチン	75 mg/m ²	day 1
デカドロン	40 mg	day 1-4
リツキシマブ	375 mg/m ²	day 8

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 生理食塩水 塩化カリウム 硫酸Mg補正液	500 mL 10 mEq 10 mEq	90 分
	Rp. 3 生理食塩水 パロノセトロン デキサメタゾン	100 mL 0.75 mg 40 mg	15 分
	Rp. 4 生理食塩水 ゲムシタビン	100 mL 1000 mg/m ²	30 分
	Rp. 5 D-マンニトール・D-ソルビトール	300 mL	30 分
	Rp. 6 生理食塩水 シスプラチン	500 mL 75 mg/m ²	60 分
day 8	Rp. 8 生理食塩水	500 mL	90 分
	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 生理食塩水 デキサメタゾン d-クロルフェニラミン	50 mL 6.6 mg 5 mg	15 分
	Rp. 3 生理食塩水 ゲムシタビン	100 mL 1000 mg/m ²	30 分
	Rp. 3 生理食塩水 リツキシマブ 初回は50mL/hrから開始、30分毎に50mL/hrずつ速度アップ可（最大400mL/hr）	250~700 mL 375 mg/m ²	90 分

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
