

## RAM+PTX 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
胃がん	進行再発	28 日	軽度
抗がん剤	投与量	投与日	
ラムシルマブ	8 mg/kg	day 1, 15	
パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8, 15	
投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1, 15	Rp. 1 生理食塩水  Rp. 2 生理食塩水 ファモチジン デキサメタゾン d-クロルフェニラミン  Rp. 3 生理食塩水 ラムシルマブ  Rp. 4 生理食塩水  Rp. 5 5%ブドウ糖液 パクリタキセル	100 mL  50 mL 20 mg 9.9 mg 5 mg  250 mL 8 mg/kg  50 mL  250 mL 80 mg/m <sup>2</sup>	15 分  60 分  ラインフラッシュ  60 分
day 8	Rp. 1 生理食塩水  Rp. 2 生理食塩水 ファモチジン デキサメタゾン d-クロルフェニラミン  Rp. 3 5%ブドウ糖液 パクリタキセル	100 mL  50 mL 20 mg 9.9 mg 5 mg  250 mL 80 mg/m <sup>2</sup>	15 分  60 分

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用