

Tmab+CapeOX 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
胃癌	進行再発	21日	中等度

抗がん剤	投与量	投与日
トラスツズマブ	6 mg/kg (初回 8 mg/kg)	day 1
オキサリプラチン	130 mg/m ²	day 1
カペシタビン	2000 mg/m ²	day 1-14

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 生理食塩水 パロノセトロン デキサメタゾン	50 mL 0.75 mg 6.6 mg	15分
	Rp. 3 生理食塩水 トラスツズマブ (初回は 8mg/kg で 90分で投与)	250 mL 6 mg/kg	30分
	Rp. 4 5%ブドウ糖液 オキサリプラチン デキサメタゾン	500 mL 130 mg/m ² 1.65 mg	120分
day 1-14	カペシタビン 1.36m ² 未満 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 1.96m ² 以上	2400 mg/日 3000 mg/日 3600 mg/日 4200 mg/日	

制吐薬 (内服)

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
