

CAP+CDDP 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
胃がん	進行再発	21 日	高度

抗がん剤	投与量	投与日
カペシタビン	2000 mg/m ²	day 1-14
シスプラチン	80 mg/m ²	day 1

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 生理食塩水 塩化カリウム 硫酸Mg補正液	500 mL 10 mEq 10 mEq	90 分
	Rp. 3 パロノセトロンバック ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75 mg/50mL 235 mg 9.9 mg	30 分
	Rp. 4 D-マンニトール・D-ソルビトール	300 mL	30 分
	Rp. 5 生理食塩水 シスプラチン	500 mL 80 mg/m ²	60 分
	Rp. 6 ブドウ等-電解質液(維持液)	500 mL	90 分
day 1 -14	カペシタビン 1.36m ² 未満 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 1.96m ² 以上	2400 mg/日 3000 mg/日 3600 mg/日 4200 mg/日	

制吐薬 (内服)

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
