

Bmab + CapeIRI 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
大腸がん	進行再発	21 日	中等度

抗がん剤	投与量	投与日
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day 1
イリノテカン	200 mg/m <sup>2</sup>	day 1
カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup>	day 1-14

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 生理食塩水 パロノセトロン デキサメタゾン	50 mL 0.75 mg 6.6 mg	15 分
	Rp. 3 生理食塩水 ベバシズマブ (初回 90分 2回目 60分)	100 mL 7.5 mg/kg	30 分
	Rp. 4 生理食塩水	50 mL	ラインフラッシュ
	Rp. 5 5%ブドウ糖液 イリノテカン	250 mL 200 mg/m <sup>2</sup>	90 分
day 1 - 14	カペシタビン 1.36m <sup>2</sup> 未満 1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満 1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満 1.96m <sup>2</sup> 以上	2400 mg/日 3000 mg/日 3600 mg/日 4200 mg/日	

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用