

Bmab+SIR 療法

| 適応疾患 | 適応分類 | 1コースの日数 | 催吐性リスク |
|------------|---|---|--|
| 大腸がん | 進行再発 | 21 日 | 中等度 |
| 抗がん剤 | 投与量 | 投与日 | |
| ベバシズマブ | 7.5 mg/kg | day 1 | |
| イリノテカン | 150 mg/m ² | day 1 | |
| S-1 | 80 mg/m ² | day 1 – 14 | |
| 投与日 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 |
| day 1 | Rp. 1 生理食塩水 Rp. 2 生理食塩水 パロノセトロン デキサメタゾン Rp. 3 生理食塩水 ベバシズマブ (初回 90分 2回目 60分) Rp. 4 生理食塩水 Rp. 5 5%ブドウ糖液 イリノテカン | 100 mL 50 mL 0.75 mg 6.6 mg 100 mL 7.5 mg/kg 50 mL 250 mL 150 mg/m ² | 15 分 30 分 ラインフラッシュ 90 分 |
| day 1 – 14 | S-1 1.25m ² 未満 1.25m ² 以上1.5m ² 未満 1.5m ² 以上 | 80 mg/日 100 mg/日 120 mg/日 | |

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用