

Bmab+sLV 5FU2 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
大腸がん	進行再発	14日	軽度

抗がん剤	投与量	投与日
ベバシズマブ	5 mg/kg	day 1
レボホリナート	200 mg/m ²	day 1
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day 1
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day 1, 2

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1 生理食塩水	10 mL	15分 30分 ラインフラッシュ 120分 5分 46時間
	Rp. 2 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 3 生理食塩水 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg	
	Rp. 4 生理食塩水 ベバシズマブ (初回 90分 2回目 60分)	100 mL 5 mg/kg	
	Rp. 5 生理食塩水	50 mL	
	Rp. 6 5%ブドウ糖液 レボホリナート	250 mL 200 mg/m ²	
	Rp. 7 生理食塩水 フルオロウラシル	50 mL 400 mg/m ²	
	Rp. 8 生理食塩水 フルオロウラシル	100 mL 2400 mg/m ²	

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
