

SOX 療法

| 適応疾患 | 適応分類 | 1コースの日数 | 催吐性リスク |
|------|-----------|---------|--------|
| 大腸がん | 術後補助、進行再発 | 21 日 | 中等度 |

| 抗がん剤 | 投与量 | 投与日 |
|----------|-----------------------|------------|
| オキサリプラチン | 130 mg/m ² | day 1 |
| S-1 | 80 mg/m ² | day 1 - 14 |

| 投与日 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 |
|------------|---|--|-------|
| day 1 | Rp. 1 生理食塩水 | 100 mL | 15 分 |
| | Rp. 2 生理食塩水 パロノセトロン デキサメタゾン | 50 mL 0.75 mg 6.6 mg | |
| | Rp. 3 5%ブドウ糖液 オキサリプラチン デキサメタゾン | 500 mL 130 mg/m ² 1.65 mg | |
| day 1 - 14 | S-1 | 80 mg/日 | 120 分 |
| | 1.25m ² 未満 | 100 mg/日 | |
| | 1.25m ² 以上1.5m ² 未満 1.5m ² 以上 | 120 mg/日 | |

制吐薬（内服）

| |
|---------------------|
| 制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用 |
|---------------------|