

Bmab+PTX 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
乳がん	進行再発	21日	軽度

抗がん剤	投与量	投与日
ベバシズマブ	10 mg/kg	day 1, 15
パクリタキセル	90 mg/m ²	day 1, 8, 15

投与日	Rp	薬剤名	投与量	投与時間
day 1, 15	Rp. 1	生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2	生理食塩水 ファモチジン デキサメタゾン d-クロルフェニラミン	50 mL 20 mg 9.9 mg 5 mg	15分
	Rp. 3	生理食塩水 ベバシズマブ (初回 90分 2回目 60分)	100 mL 10 mg/kg	30分
	Rp. 4	生理食塩水	50 mL	ラインフラッシュ
	Rp. 5	5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 90 mg/m ²	60分
day 8	Rp. 1	生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2	生理食塩水 ファモチジン デキサメタゾン d-クロルフェニラミン	50 mL 20 mg 9.9 mg 5 mg	15分
	Rp. 3	5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 90 mg/m ²	60分

制吐薬 (内服)

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
