

nab-PTX+CBDCA 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
非小細胞肺癌	進行再発	28 日	中等度

抗がん剤	投与量	投与日
nab-パクリタキセル	100 mg/m ²	day 1, 8, 15
カルボプラチン	AUC=6	1

投与日	Rp	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1	生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2	生理食塩水 ホスアプレピタント	100 mL 150 mg	30 分
	Rp. 3	グラニセトロン デキサメタゾン	3 mg/100mL 4.95 mg	30 分
	Rp. 4	生理食塩水 nab-パクリタキセル	50 mL 100 mg/m ²	30 分
	Rp. 5	生理食塩水	50 mL	ラインフラッシュ
	Rp. 6	5%ブドウ糖液 カルボプラチン	250 mL AUC=6	60 分
day 8, 15	Rp. 1	生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2	生理食塩水 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg	15 分
	Rp. 3	生理食塩水 nab-パクリタキセル	50 mL 100 mg/m ²	30 分

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用