

ニボルマブ+イピリムマブ+PTX(triweekly)+CBDCA 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
非小細胞肺癌	進行再発	42 日	中等度

抗がん剤	投与量	投与日
ニボルマブ	360 mg	day 1, 22
イピリムマブ	1 mg/kg	day 1
パクリタキセル	200 mg/m ²	day 1, 22
カルボプラチン	AUC=6	day 1, 22

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 生理食塩水 ニボルマブ	100 mL 360 mg	30 分
	Rp. 3 生理食塩水	50 mL	30 分
	Rp. 4 生理食塩水 イピリムマブ	50 mL 1 mg/kg	30 分
day 1, 22	Rp. 5 生理食塩水	50 mL	
	Rp. 6 生理食塩水 ホスアプレピタント	100 mL 150 mg	30 分
	Rp. 7 グラニセトロン デキサメタゾン ファモチジン d-クロルフェニラミン	3 mg/100mL 13.2 mg 20 mg 5 mg	30 分
	Rp. 8 5%ブドウ糖液 パクリタキセル	500 mL 200 mg/m ²	180 分
	Rp. 9 5%ブドウ糖液 カルボプラチン	250 mL AUC=6	60 分

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
