

mFOLFIRINOX 療法

| | | | |
|------|------|---------|--------|
| 適応疾患 | 適応分類 | 1コースの日数 | 催吐性リスク |
| 膵臓がん | 進行再発 | 14 日 | 高度 |

| 抗がん剤 | 投与量 | 投与日 |
|----------|------------------------|---------|
| オキサリプラチン | 85 mg/m ² | day 1 |
| レボホリナート | 200 mg/m ² | day 1 |
| イリノテカン | 150 mg/m ² | day 1 |
| フルオロウラシル | 2400 mg/m ² | day 1-2 |

| 投与日 | Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 |
|-------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|------|
| day 1 | Rp. 1 | 生理食塩水 | 10 mL | 30 分 |
| | Rp. 2 | 生理食塩水 | 100 mL | |
| | Rp. 3 | 生理食塩水 ホスアプレピタント | 100 mL 150 mg | |
| | Rp. 4 | 生理食塩水 パロノセトロン デキサメタゾン | 50 mL 0.75 mg 9.9 mg | |
| | Rp. 5 | 5%ブドウ糖液 オキサリプラチン | 250 mL 85 mg/m ² | |
| | Rp. 6 | 5%ブドウ糖液 レボホリナート | 250 mL 200 mg/m ² | |
| | Rp. 7 | 5%ブドウ糖液 イリノテカン (レボホリナートと同時に点滴) | 250 mL 150 mg/m ² | |
| | Rp. 8 | 生理食塩水 フルオロウラシル | 100 mL 2400 mg/m ² | |

制吐薬（内服）

| |
|---------------------|
| 制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用 |
|---------------------|