

高度催吐性リスク群

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5
 (抗がん薬投与前)

アプレピタント (mg)	125	80	80		
もしくは ホスアプレピタント (mg)	150				
5-HT ₃ 受容体拮抗薬					
デキサメタゾン (mg)	9.9	8	8	8	8
	急性	遅発性			

中等度催吐性リスク群

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4


Day 5

(抗がん薬投与前)

カルボプラチン使用時、(オプション: オキサリプラチン、イホスファミド、イリノテカン、メトトレキサートなど)				
アプレピタント (mg)	125	80	80	* 括弧内は代替用量
もしくは ホスアプレピタント (mg)	150			
5-HT ₃ 受容体拮抗薬				
デキサメタゾン (mg)	4.95 (3.3) [*]	4	4	4

その他レジメン				
5-HT ₃ 受容体拮抗薬				
デキサメタゾン (mg)	9.9 (6.6) [*]	8	8	8
	急性	遅発性		

軽度催吐性リスク群

	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
	(抗がん薬投与前)				
デキサメタゾン (mg)	 6.6 (3.3) [*]				* 括弧内は代替用量
	急性	遅発性			

最小度催吐性リスク群

	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
(抗がん薬投与前)					
	■		■		■
	■		■		■

通常、予防的な制吐療法は推奨されない