

ステップ名称		検査当日		検査翌日
		基準日		1日後
		検査前	検査後	
患者状態		■合併症の症状・所見がない ・気胸の症状がない ・肺炎の症状がない		■合併症の症状・所見がない ・気胸の症状がない ・肺炎の症状がない
知識・教育・理解		■検査について理解できる ・検査に対する不安の訴えがない ・必要性が理解できる		■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の生活に対する不安の訴えがない
治療	処置	 飲食指示 検査開始3時間前から飲水不可	 飲食指示 検査終了2時間後に飲水テスト 問題無ければ飲食可	
			 局所麻酔	
	注射	 ソリュージェンF注500mL	 アドナ注100mg トランサミン注10%	
		 硫酸アトロピン注射液0.5mg		
		 ミダゾラム注10mg「サンド」 20mL生食液NS 0.1mgフェンタニル注射液「ヤンセン」 (2mL)		
		 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg		
 アネキセート注射液0.5mg				
内服				
検査				
画像検査				 [XP] 胸部 正面 ・午前 朝一でお願いします
リハビリ				
栄養				
清潔	 清潔ケア シャワー浴	 清潔ケア シャワー浴	 清潔ケア シャワー浴	
活動	 安静度 院内フリー	 安静度 院内フリー	 安静度 院内フリー	
排泄				
観察項目	 副雑音（左） 副雑音（右）	 副雑音（左） 副雑音（右）	 副雑音（左） 副雑音（右）	
	 咳嗽 喀痰	 咽頭不快 喀痰色調 呼吸困難 疼痛 熱感	 咽頭不快 喀痰色調 呼吸困難 疼痛 熱感	
指導・説明	 コメント		 コメント	
	 コメント		 コメント	
	 コメント		 中止薬再開確認	
	 コメント			
	 病歴確認			