

ステップ名称		入院日	手術当日		
		1日目	2日目		3日目
		術前日	術前	術後	術後1日目
患者状態			■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・胆管炎症状がない		
知識・教育・理解		■手術について理解できる ・オリエンテーション内容を言える ・手術・麻酔に対する不安の訴えがない ・必要性が理解できる			
治療	処置	術前指示 臍処置 術前指示 剃毛		褥室後3時間で水分可	ドレナージ管理 2日目以降 ドレナージ管理
				心電図モニター装着（術翌日朝まで）	心電図モニター装着（術翌日朝まで）
				尿測 3時間毎	尿測 3時間毎
				酸素吸入 酸素マスクor酸素カニューラ（麻	酸素吸入 酸素マスクor酸素カニューラ（麻
				酸素吸入(ボンベ) 酸素カニューラ 酸素マスク	膀胱留置カテーテル除去
				フットポンプ装着	フットポンプ除去
				弾性ストッキング着用	弾性ストッキング除去
					ドレナージ管理
	注射		ソリュージェンF500mI（2件目～の手術の場合）	アクメイン注500mL	
				500mLソルデム3A輸液	
				500mLソルデム3A輸液	
	内服			200mgセレコックス錠	200mgセレコックス錠
				500mgカロナル錠	
検査					●CPK ●AST (GOT) ●ALT (GPT) ●LDH ●ALP ●γGTP ●TP ●Alb ●T Bil ●D Bil ●血算 ●BUN ●Cre ●Na ●K ●Cl ●AMY ●CRP ●血糖
画像検査				手術室 イメージ 胆道	胸部 臥位正面 腹部 正面（臥位）
リハビリ					
栄養			朝から 朝：絶食 昼：絶食 夕：絶食		朝から 朝：絶食 昼：全粥食 夕：パス適用前の食事を引用
清潔		清潔ケア シャワー浴		清潔ケア 洗面 清潔ケア 清拭 全身 清潔ケア 病衣交換	
活動		安静度 院内フリー	安静度 院内フリー	安静度 絶対安静	安静度 病棟内フリー
排泄					
観察項目				嘔気 嘔吐 出血（創部） 腸蠕動音 排ガス	嘔気 嘔吐 出血（創部） 腸蠕動音 排ガス
				疼痛程度（NRS）	疼痛程度（NRS）
				肝下面ドレナージ排液量 mL 肝下面ドレナージ排液性状	肝下面ドレナージ排液量 mL 肝下面ドレナージ排液性状
				尿量（尿道留置カテーテル）mL	尿量（尿道留置カテーテル）mL
指導・説明		入院・術前オリエンテーション		手術の結果説明	

術後					
4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	
術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6日目	
■ 抜去部に問題がない ・ドレーン抜去部に発赤・腫脹・出血・滲出液がない ・出血がない ・抜去部に出血がない ■ 創痛のコントロールができています ・疼痛がない ・NRS【適正値：0/10～5/10】					
ドレナージ管理 2日目を以降 ドレーン抜去	ドレナージ管理 2日目を以降 ドレーン抜去				
腹腔ドレーン 2日目を以降 持続吸引なし	腹腔ドレーン 2日目を以降 持続吸引なし				
朝から 朝：バス適用前の食事を引用 昼：バス適用前の食事を引用 夕：バス適用前の食事を引用					
ドレーン抜去後シャワー浴可	ドレーン抜去後シャワー浴可	ドレーン抜去後シャワー浴可	ドレーン抜去後シャワー浴可	ドレーン抜去後シャワー浴可	ドレーン抜去後シャワー浴可
安静度 病棟内フリー	安静度 病棟内フリー	安静度 院内フリー	安静度 院内フリー	安静度 院内フリー	安静度 院内フリー
嘔気 嘔吐 出血（創部） 腸蠕動音 排ガス	嘔気 嘔吐 出血（創部） 腸蠕動音 排ガス	嘔気 嘔吐 出血（創部） 腸蠕動音 排ガス	嘔気 嘔吐 出血（創部） 腸蠕動音 排ガス		
肝下面ドレーン排液量 mL 肝下面ドレーン排液性状	肝下面ドレーン排液量 mL 肝下面ドレーン排液性状				
退院時指導（退院可能）					

[illegible]