

硝子体手術2週間_Ver.1

ステップ名称		入院		手術当日	
		1日目		2日目	
				手術前	手術後
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> ■合併症の症状・所見がない ・右眼球結膜充血がない ・右眼痛がない 			
		<ul style="list-style-type: none"> ■感染の徴候がない ・体温上昇がない 			
		<ul style="list-style-type: none"> ■創部に問題がない ・ガーゼの上層汚染がない 			
知識・教育・理解					
生活動作・日常動作・リハビリ		<ul style="list-style-type: none"> ■転倒予防行動ができる ・転倒予防行動を実施できる 		<ul style="list-style-type: none"> ■転倒予防行動ができる ・転倒予防行動を実施できる ・転倒しない 	
治療	処置	細隙顕微鏡(前眼部及び後眼部) 精密眼底検査(片側)	細隙顕微鏡(前眼部及び後眼部) 精密眼底検査(片側)		
	注射				
	内服	<術眼点眼> 入院前の点眼継続 がチロ、プロック、ミドリP ※持参忘れたらべがモックス代用 午後3時ミドリNP点眼	<術眼点眼> 2時間前から30分毎に がチロ、プロック、ミドリP ※がチロなければがモックス 1時間前から30分毎に チロ4% 指示された点眼以外中止		
検査					
画像検査					
リハビリ					
栄養					
清潔	清潔ケア シャワー浴 継続的観察	病衣・術衣交換	洗面タオル配布		
活動				安静度 室内フリー	
排泄	尿回数	→	尿回数	→	尿回数
	便回数	→	便回数	→	便回数
観察項目	酸素飽和度測定	→	酸素飽和度測定	→	酸素飽和度測定
		疼痛程度(NRS)	→	疼痛程度(NRS)	
		体温		体温2検	
		脈拍数		脈拍2検	
		血圧測定		血圧測定2検	
		酸素飽和度測定	→	酸素飽和度測定	
				酸素飽和度測定2検	
指導・説明				帰宅後 ベッド上安静 手術室から体位申し送られる (トイレ・食事は可)	
	コメント			日常生活指導(10日間洗顔・洗髪 禁止説明)	
	コメント				
	コメント				
	コメント				

			術後13日目退院
11日目	12日目	13日目	14日目
			<ul style="list-style-type: none"> ■合併症の症状・所見がない ・右眼球結膜充血がない ・右眼痛がない
			<ul style="list-style-type: none"> ■自己管理ができる ・日常生活の注意点を知っている
			<ul style="list-style-type: none"> ■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の生活に対する不安の訴えがない ・日常生活の注意点を知っている
			<ul style="list-style-type: none"> ■転倒予防行動ができる ・転倒予防行動を実施できる ・転倒しない
			 精密眼圧検査 細隙燈顕微鏡(前眼部及び後眼部)
			
			
 洗顔・洗髪可			
→ 安静度 室内フリー	→ 安静度 室内フリー	→ 安静度 室内フリー	→ 安静度 室内フリー
→ 尿回数	→ 尿回数	→ 尿回数	
→ 便回数	→ 便回数	→ 便回数	
→ 疼痛程度(NRS)	→ 疼痛程度(NRS)	→ 疼痛程度(NRS)	 右眼充血の有無
→ 疼痛(眼)	→ 疼痛(眼)	→ 疼痛(眼)	→ 疼痛(眼)
			 点眼指導
			 退院時指導 眼を押したりこすったりしないこと。 退院療養計画書の説明

硝子体手術3週間_Ver.1

ステップ名称		入院		手術当日	
		1日目		2日目	
				手術前	手術後
患者状態				■合併症の症状・所見がない ・右眼球結膜充血がない ・右眼痛がない	
				■感染の徴候がない ・体温上昇がない	
				■創部に問題がない ・ガーゼの上層汚染がない	
				■疼痛のコントロールができていない ・疼痛がない	
知識・教育・理解					
生活動作・日常動作・リハビリ		■転倒予防行動ができる ・転倒予防行動を実施できる ・転倒しない		■転倒予防行動ができる ・転倒予防行動を実施できる ・転倒しない	
治療	処置	細隙顕微鏡(前眼部及び後眼部) 精密眼底検査(片側)	細隙顕微鏡(前眼部及び後眼部) 精密眼底検査(片側)		
	注射		1時間前からワラス1号点滴 セゾアム1gと生食100mlは手術室持		
	内服	<術眼点眼> 入院前の点眼継続 ガチロ1日4回 ※持参忘れてたべがモクス代用 午後3時ミドリnP点眼 ※浅前房の場合は中止	<術眼点眼> 2時間前から30分毎に ガチロ、プロナック、ミドリnP ※ガチロなければべがモクス 1時間前から30分毎に キロカイン4% 指示された点眼以外中止		
検査					
画像検査					
リハビリ					
栄養					
清潔			病衣・術衣交換	洗面タオル配布	
活動					
排泄		便回数	⇒ 便回数	⇒ 便回数	
		尿回数	⇒ 尿回数	⇒ 尿回数	
観察項目		体温	体温	体温2検	
		脈拍数	脈拍数	脈拍2検	
		血圧測定	血圧測定	血圧測定2検	
		酸素飽和度測定	⇒ 酸素飽和度測定	酸素飽和度測定2検	
				疼痛(眼)	
				角綿汚染の有無	
指導・説明		入院・手術オリエンテーション	入浴休み	入浴休み	
		クリニカルパス説明		ベッド上安静、体位は手術室の申し送りの通り	
		転倒転落アセスメントシート説明		日常生活指導(10日間洗顔禁止)	
		点眼指導			

3日目	4日目	5日目	6日目
<p>■合併症の症状・所見がない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・右眼球結膜充血がない ・右眼痛がない 			
<p>■創部に問題がない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガーゼの上層汚染がない 			
<p>■疼痛のコントロールができています</p> <ul style="list-style-type: none"> ・疼痛がない 			
<p>■日常生活の注意点について理解できる</p> <ul style="list-style-type: none"> ・退院後の生活に対する不安の訴えがない ・日常生活の注意点を知っている 			
<p>■転倒予防行動ができる</p> <ul style="list-style-type: none"> ・転倒しない 			
 精密眼圧検査 細隙顕微鏡(前眼部及び後眼部)	 精密眼圧検査 細隙顕微鏡(前眼部及び後眼部)	 精密眼圧検査 細隙顕微鏡(前眼部及び後眼部)	 精密眼圧検査 細隙顕微鏡(前眼部及び後眼部)
			
			
 <内服薬> 入院前の内服継続 セカンドピル(100) 3錠3分毎食後 3日間で終了			
 洗面タオル配布	 洗面タオル配布	 洗面タオル配布	 洗面タオル配布
 清拭	 首下シャワー可 洗顔禁 洗髪禁	 首下シャワー可 洗顔禁 洗髪禁	 首下シャワー可 洗顔禁 洗髪禁
 便回数	 便回数	 便回数	 便回数
 尿回数	 尿回数	 尿回数	 尿回数
 右眼充血の有無	 右眼充血の有無	 右眼充血の有無	 右眼充血の有無
 角綿汚染の有無	 角綿汚染の有無	 角綿汚染の有無	 角綿汚染の有無
 疼痛(眼)	 疼痛(眼)	 疼痛(眼)	 疼痛(眼)
 夜勤で角綿除去し点眼指導			
 10日間は洗顔・洗髪禁 首下のみシャワー可、眼を押し した			

術後19日目（退院）
19日目
<ul style="list-style-type: none"> ■合併症の症状・所見がない <ul style="list-style-type: none"> ・右眼球結膜充血がない ・右眼痛がない
<ul style="list-style-type: none"> ■日常生活の注意点について理解できる <ul style="list-style-type: none"> ・退院後の生活に対する不安の訴えがない ・日常生活の注意点を知っている ■転倒予防行動ができる <ul style="list-style-type: none"> ・転倒しない
 精密眼圧検査 細隙燈顕微鏡（前眼部及び後眼部）



 洗面タオル配布
 首下シャワー可 洗顔禁 洗髪禁
 便回数
 尿回数
 右眼充血の有無
 疼痛（眼）
 点眼指導
 退院時指導 眼を押ししたりこすったりしない
 退院療養計画書説明 予約票・アンケート・点眼表、点